花生红衣

Huashenghongyi

ARACHIS TESTA

本品为豆科植物落花生 *Arachis hypogaea* L. 成熟种子种皮的炮制加工品。

【炮制】 除去杂质。

【性状】 本品呈碎片状，大小不一。外表面红色，有纵脉纹，内表面黄白色，脉纹明显，质轻易碎。气微，味涩、微苦。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡红色。种皮细胞顶面观呈多角形，壁有条纹状增厚，条纹有的长达细胞中心，有的内含棕色物。种皮细胞侧面观呈长方形，其外缘被有角质层。薄壁细胞淡黄色，壁呈波浪状，含淡黄色物。环纹导管或螺旋导管。

(2) 取本品粉末 2g，加水 50ml，煮沸 15 分钟，滤过，滤液用盐酸调节 pH 值至 2~3，用乙醚振摇提取 3 次，每次 10ml，合并乙醚液，挥干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取花生红衣对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（15：10：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1% 间苯三酚乙醇溶液-硫酸（1：1）的混合溶液（临用时配制），在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显示清晰，分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点和荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 15.0%（《中国药典》2020 年版通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年版通则 2302）。

【浸出物】 取本品粉末 5g，精密称定，加水 100ml，置 60 $^{\circ}$ C 水浴中浸提 2 次，每次 3 小时，滤过，合并滤液，置 250ml 量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取 50ml，置已干燥至恒重的蒸发皿中，蒸干，于 105 $^{\circ}$ C 干燥 3 小时，置干燥器中冷却 30 分钟，迅速精密称定重量。

本品按干燥品计算，不得少于 12.0%。

【性味与归经】 甘、微苦、涩，温。归心、肝经。

【功能与主治】 补血养血，益气健脾，滋补肝肾。用于各类贫血，血小板

减少性紫癜，血友病，接触核能或从事放射性工作者；以及化疗、放疗后的血液异常等病症。

【用法与用量】 5~30g。

【贮藏】 置干燥处。

山东省中药饮片
炮制规范公示稿