

附件

57个单独支付药品名单

序号	药品名称	备注	治疗病种
1	注射用司妥昔单抗	限人体免疫缺陷病毒(HIV)阴性和人疱疹病毒8型(HHV-8)阴性的多中心Castleman病(MCD)成人患者。	多中心Castleman病
2	麦格司他胶囊	限C型尼曼匹克病患者。	C型尼曼匹克病
3	注射用罗特西普	限 β -地中海贫血成人患者。	β -地中海贫血
4	地拉罗司颗粒	限：1.年龄大于2岁的 β -地中海贫血患者；2.10岁及10岁以上非输血依赖性地中海贫血综合征患者。	β -地中海贫血、非输血依赖性地中海贫血综合征
5	地拉罗司口服常释剂型		输血依赖性铁过载、非输血依赖性地中海贫血综合征患者慢性铁过载及其他说明书获批适应症
6	盐酸奥扎莫德胶囊	限成人复发型多发性硬化。	复发型多发性硬化
7	奥法妥木单抗注射液	限成人复发型多发性硬化(RMS)。	复发型多发性硬化
8	西尼莫德片	限成人复发型多发性硬化的患者。	复发型多发性硬化
9	盐酸芬戈莫德胶囊	限10岁及以上患者复发型多发性硬化(RMS)的患者。	复发型多发性硬化
10	富马酸二甲酯肠溶胶囊	限成人复发型多发性硬化(RMS)。	复发型多发性硬化
11	特立氟胺片	限常规治疗无效的多发性硬化患者。	多发性硬化
12	乌帕替尼缓释片	限：1.12岁及以上患者难治性、中重度特应性皮炎的二线治疗；2.活动性银屑病关节炎成人患者的二线治疗；3.中重度活动性类风湿关节炎成人患者的二线治疗；4.对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者；5.对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性克罗恩病成人患者；6.对非甾体抗炎药(NSAID)应答不佳且存在客观炎症征象(表现为C反应蛋白[CRP]升高和/或磁共振成像[MRI]异常)的活动性放射学阴性中轴型脊柱关节炎(nr-axSpA)成人患者；7.对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受的活动性强直性脊柱炎(AS，放射学阳性中轴型脊柱关节炎)成人患者。	特应性皮炎、银屑病关节炎、类风湿关节炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病、中轴型脊柱关节炎、强直性脊柱炎
13	氘可来昔替尼片	限适合系统治疗或光疗的成年中重度斑块状银屑病患者。	斑块状银屑病

序号	药品名称	备注	治疗病种
14	巴瑞替尼片	限：1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；2.对一种或多种既往传统合成或生物DMARDs应答不佳或不耐受的2岁及以上活动性幼年特发性关节炎患者，包括：(1)多关节型幼年特发性关节炎(多关节型类风湿因子阳性[RF+]或阴性[RF-]，扩展型少关节炎),(2)附着点炎相关关节炎,(3)幼年银屑病关节炎。可单药使用或与甲氨蝶呤联合用药。	类风湿关节炎；幼年特发性关节炎，包括：多关节型幼年特发性关节炎、附着点炎相关关节炎、幼年银屑病关节炎
15	注射用英夫利西单抗		类风湿关节炎、克罗恩病、瘰管性克罗恩病、强直性脊柱炎及其他说明书获批适应症
16	阿达木单抗注射剂		类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病、儿童克罗恩病及其他说明书获批适应症
17	依那西普注射液	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者。	类风湿关节炎、强直性脊柱炎
18	司库奇尤单抗注射液	限：1.符合系统治疗或光疗指征的中度至重度斑块状银屑病的6岁及以上患者；2.常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎的成年患者；3.既往传统的改善病情抗风湿药(cDMARDs)疗效不佳或不耐受的活动性银屑病关节炎成人患者。	斑块状银屑病、强直性脊柱炎、银屑病关节炎
19	依奇珠单抗注射液	限：1.适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块型银屑病成人患者；2.常规治疗疗效欠佳的活动性强直性脊柱炎成人患者。	斑块型银屑病、强直性脊柱炎
20	阿加糖酶α注射用浓溶液	限法布雷病(α-半乳糖苷酶A缺乏症)患者的长期酶替代治疗，适用于成人、儿童和青少年。尚未确定本品在0-6岁儿童中的安全性和有效性。	法布雷病
21	佩索利单抗注射液	限成人泛发性脓疱型银屑病(GPP)。	泛发性脓疱型银屑病
22	酒石酸艾格司他胶囊	限经CYP2D6基因型检测为弱代谢型(PMs)、中间代谢型(IMs)或快代谢型(EMs)的I型戈谢病(GD1)成年患者。	I型戈谢病
23	诺西那生钠注射液	限5q脊髓性肌萎缩症。	5q脊髓性肌萎缩症

序号	药品名称	备注	治疗病种
24	利司扑兰口服溶液用散	限治疗16日龄及以上患者的脊髓性肌萎缩症(SMA)。	脊髓性肌萎缩症
25	西罗莫司凝胶	限成人和6岁及以上儿童患者的结节性硬化症相关面部血管纤维瘤。	结节性硬化症相关面部血管纤维瘤
26	尼替西农胶囊	限成人和儿童酪氨酸血症 I 型(HT-1)。	酪氨酸血症 I 型
27	萨特利珠单抗注射液	限≥12岁青少年及成人患者水通道蛋白4(AQP4)抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)。	视神经脊髓炎谱系疾病
28	伊奈利珠单抗注射液	限抗水通道蛋白4(AQP4)抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)成人患者。	视神经脊髓炎谱系疾病
29	氘丁苯那嗪片	限治疗成人：与亨廷顿病有关的舞蹈病；迟发性运动障碍。	舞蹈病、迟发性运动障碍
30	拉那利尤单抗注射液	限12岁及以上患者预防遗传性血管性水肿(HAE)发作。	遗传性血管性水肿
31	氨己烯酸口服溶液用散	限婴儿痉挛症。	婴儿痉挛症
32	盐酸伊普可泮胶囊	限既往未接受过补体抑制剂治疗的阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)成人患者。	阵发性睡眠性血红蛋白尿症
33	醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式)	限：1.肢端肥大症患者；2.不可切除、高分化或中分化、局部晚期或转移性胃肠胰神经内分泌瘤(GEP-NETs)的成人患者；3.类癌综合征成人患者。	肢端肥大症、胃肠胰神经内分泌瘤、类癌综合征
34	注射用醋酸奥曲肽微球	限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症。	胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症
35	艾加莫德 α 注射液	限乙酰胆碱受体(AChR)抗体阳性的成人全身型重症肌无力(gMG)患者。	全身型重症肌无力
36	依库珠单抗注射液	限：1.阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)的患者；2.非典型溶血性尿毒症综合征(aHUS)的患者；3.抗乙酰胆碱受体(AChR)抗体阳性的难治性全身型重症肌无力(gMG)成人患者。	阵发性睡眠性血红蛋白尿症、非典型溶血性尿毒症综合征、全身型重症肌无力
37	氯苯唑酸葡胺软胶囊	限成人转甲状腺素蛋白淀粉样变性多发性神经病I期症状患者。	转甲状腺素蛋白淀粉样变性多发性神经病I期
38	氯苯唑酸软胶囊	限成人野生型或遗传型转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病(ATTR-CM)。	转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病
39	乙磺酸尼达尼布软胶囊	限：1.特发性肺纤维化(IPF)；2.系统性硬化病相关间质性肺疾病(SSc-ILD)；3.具有进行性表型的慢性纤维化性间质性肺疾病。	特发性肺纤维化、系统性硬化病相关间质性肺疾病、慢性纤维化性间质性肺疾病

序号	药品名称	备注	治疗病种
40	达雷妥尤单抗注射液(皮下注射)	限：1.与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者；2.与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者；3.与泊马度胺和地塞米松联合用药治疗既往接受过至少一线治疗(包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂)的多发性骨髓瘤患者；4.单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展；5.新诊断的原发性轻链型淀粉样变患者。本方案不适合也不推荐用于患有NYHA ⅢB级或Ⅳ级心脏疾病或Mayo ⅢB期的原发性轻链型淀粉样变患者。	多发性骨髓瘤、原发性轻链型淀粉样变
41	玛伐凯泰胶囊	限纽约心脏协会(NYHA)心功能分级Ⅱ-Ⅲ级的梗阻性肥厚型心肌病(oHCM)成人患者。	梗阻性肥厚型心肌病
42	注射用奥马珠单抗	限：1.经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β_2 -肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性鼻炎的6岁及以上患者，并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据；2.H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。	过敏性鼻炎、慢性自发性荨麻疹
43	奥马珠单抗注射液	限：1.经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β_2 -肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性鼻炎的6岁及以上患者，并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据；2.H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。	过敏性鼻炎、慢性自发性荨麻疹
44	注射用奥马珠单抗 α	限经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β_2 -肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性鼻炎的15岁及以上患者，并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据。	过敏性鼻炎
45	美泊利单抗注射液	限：1.成人和12岁及以上青少年重度嗜酸粒细胞性哮喘(SEA)的维持治疗；2.成人嗜酸性肉芽肿性多血管炎(EGPA)。	嗜酸粒细胞性哮喘、嗜酸性肉芽肿性多血管炎
46	乌司奴单抗注射液(静脉输注)	限对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF- α)拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	克罗恩病

序号	药品名称	备注	治疗病种
47	乌司奴单抗注射液	限：1.对环孢素、甲氨喋呤(MTX)等其他系统性治疗或PUVA(补骨脂素和紫外线A)不应答、有禁忌或无法耐受的成年中重度斑块状银屑病患者；2.对其他系统性治疗或光疗应答不足或无法耐受的6岁及以上儿童和青少年(体重60公斤至100公斤)中重度斑块状银屑病患者；3.对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF α)拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	斑块状银屑病、克罗恩病
48	注射用维得利珠单抗	限：1.对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF α)抑制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性溃疡性结肠炎的成年患者；2.对传统治疗或TNF α 抑制剂应答不充分、失应答或不耐受的中度至重度活动性克罗恩病的成年患者。	溃疡性结肠炎、克罗恩病
49	古塞奇尤单抗注射液	限适合系统性治疗的成人中重度斑块状银屑病。	斑块状银屑病
50	替瑞奇珠单抗注射液	限适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块状银屑病成人患者。	斑块状银屑病
51	度普利尤单抗注射液	限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者，需按说明书用药。	特应性皮炎
52	阿布昔替尼片	限其他系统治疗(如激素或生物制剂)应答不佳或不适宜上述治疗的难治性、中重度特应性皮炎成人和12岁及以上青少年患者。	特应性皮炎
53	注射用泰它西普	限与常规治疗联合，适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如：抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 ≥ 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者。	系统性红斑狼疮
54	注射用贝利尤单抗	限：1.在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如：抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 ≥ 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)5岁及以上患者；2.与常规治疗联合用于活动性狼疮肾炎成人患者。	系统性红斑狼疮、狼疮肾炎
55	布地奈德肠溶胶囊	限具有进展风险的原发性免疫球蛋白A肾病(IgAN)成人患者。	原发性免疫球蛋白A肾病
56	注射用艾博韦泰	限艾滋病病毒感染。	艾滋病
57	硫酸氢司美替尼胶囊	限3岁及3岁以上伴有症状、无法手术的丛状神经纤维瘤(PN)的I型神经纤维瘤病(NF1)儿童患者。	I型神经纤维瘤病